

Données du patient

Nom du patient/de la patiente

Date de naissance

Indication de l'anticoagulation orale

Nom du produit

Posologie

Coordonnées du médecin prescripteur

Carte patient

Produit :

Cher patient,

Votre médecin vient de vous prescrire un traitement par un nouvel anticoagulant oral. Pour utiliser le produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement les informations inscrites sur la face interne de la carte.

Cette carte contient des informations importantes relatives à votre traitement. Veillez à toujours l'avoir sur vous afin que le personnel médical soit tenu informé.

DEMANDEZ À VOTRE MÉDECIN
DE REMPLIR LES SECTIONS « PRODUIT »
ET « DONNÉES DU PATIENT » DE LA CARTE.

Les nouveaux anticoagulants oraux : Information à l'attention des patients

- Veuillez à toujours porter la carte patient sur vous. Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin, pendant tout votre traitement.
- Prenez le traitement avec régularité, comme prescrit, et ne sautez aucune dose.
- Les anticoagulants empêchent la formation de caillots en rendant votre sang plus fluide. Cela peut néanmoins augmenter le risque de saignement.
- Comme les nouvelles molécules agissent sur le système de coagulation du sang, la plupart des effets indésirables sont liés à cette action. Les signes et symptômes de saignement peuvent être un «bleu» au niveau de la peau, des selles noires, la présence de sang dans les urines, un saignement de nez, etc...
- Consultez immédiatement votre/un médecin en cas de saignement qui ne s'arrête pas spontanément. Envisagez avec lui l'interruption éventuelle de votre traitement.
- N'arrêtez pas de prendre ce médicament sans consulter tout d'abord votre médecin, car vous êtes à risque de présenter un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications en raison de la formation de caillots sanguins.
- En cas d'interventions chirurgicales ou invasives nécessaires, informez le médecin que vous prenez ce médicament anticoagulant.

Les nouveaux anticoagulants oraux : Information à l'attention des médecins

- Les nouveaux anticoagulants oraux agissent par inhibition directe du facteur Xa ou de la thrombine et ils ont un temps de demi-vie court (\pm 12h)
- En cas de saignements majeurs, ils doivent être arrêtés immédiatement.
- Le traitement avec ces nouveaux anticoagulants doit être arrêté avant un acte chirurgical ou une autre intervention invasive (pour plus de détails, voir le Résumé des Caractéristiques du Produit du produit concerné).
- Pour plus de détails et de conseils sur la réversibilité de l'effet anticoagulant de ces nouveaux anticoagulants oraux, voir le Résumé des Caractéristiques du Produit du produit concerné.